

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Brand- und Wundgel Medice®N

Apothekenpflichtig

Zusammensetzung

100 g Gel enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile: Benzethoniumchlorid 0,1 g, Polidocanol 2 g, Harnstoff 7 g

Sonstige Bestandteile: Natriumalginat, Glycerol, gereinigtes Wasser, Natriumdihydrogenphosphat 2H₂O, Natriummonohydrogenphosphat 12H₂O

Darreichungsform und Inhalt

1 Packung enthält: 25/50 g Gel

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Brand- und Wundgel Medice®N ist eine Wirkstoffkombination aus wasserlöslicher, fettfreier Gelgrundlage zur lokalen Anwendung. Nach mäßig dickem Auftragen auf die verletzte Haut trocknet Brand- und Wundgel Medice®N langsam an, wonach sich ein filmähnlicher, luftdurchlässiger Überzug bildet, der die betroffenen Hautpartien schützt, ohne den Abfluss des Wundsekrets zu beeinträchtigen. Bei Verbrennungen bzw. Verbrühungen und Verletzungen durch Chemikalien befallene Kleidung sofort entfernen. Betroffene Hautpartien mehrere (ca. 10) Minuten mit kaltem Wasser spülen. Weitere Folgen und Schmerzen werden dadurch gemildert. Die Anwendung kann bei Nachlassen der schmerzlindernden Wirkung mehrfach wiederholt werden. Sogenannte 'Hausmittel' wie Mehl, Butter, Öl etc. dürfen keinesfalls verwendet werden. Verschmutzte Wunden (z. B. Schürfwunden) mit handwarmem Wasser reinigen; starke Wundabsonderungen abtupfen, dann Brand- und Wundgel Medice®N auftragen.

Brand- und Wundgel Medice®N enthält ein breit wirksames Desinfektionsmittel, das für eine zuverlässige Beherrschung von durch Bakterien und Pilze hervorgerufene Infektionen sorgt. Darüber hinaus reinigt Brand- und Wundgel Medice®N die Wundflächen, leitet Sekrete nach außen ab, wirkt heilungsfördernd und desodorierend, ohne gesundes Gewebe zu reizen. Zusätzlich wirkt es kühlend sowie schmerz- und juckreizstillend.

Hersteller: MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn, Tel.: 02371/937-0, Fax: 02371/937-329

Anwendungsgebiete

Verbrennungen, Verätzungen, Sonnenbrand, Schürfwunden, bakterielle Infektionen der Haut, Nagelumlauf, Insektenstiche.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Brand- und Wundgel Medice®N nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Nicht ins Auge bringen.

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Brand- und Wundgel Medice®N oder werden in ihrer Wirkung beeinflusst?

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewendete Arzneimittel gelten können.

Die Freisetzung von Wirkstoffen aus anderen Hautpräparaten und deren Aufnahme in die Haut kann durch Brand- und Wundgel Medice®N verstärkt werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Brand- und Wundgel Medice®N nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Brand- und Wundgel Medice®N sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von Brand- und Wundgel Medice®N und wie oft sollten Sie Brand- und Wundgel Medice®N anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, wird Brand- und Wundgel Medice®N in dünner Schicht aufgetragen. Sobald die schmerzlindernde und kühlende Wirkung abklingt, wird die Anwendung in gleicher Weise wiederholt.

Wie und wann sollten Sie Brand- und Wundgel Medice®N anwenden?

Brand- und Wundgel Medice®N soll nicht über einen längeren Zeitraum großflächig angewendet werden. Das langsame Antrocknen des Gels ist bei diesem Präparat erwünscht, damit die in gelöster Form vorliegenden Wirkstoffe länger und intensiver einwirken können. An unbedeckten Körperstellen sollte man möglichst auf einen Mullverband verzichten; dieser kann jedoch bei Bedarf über dem trockenen Gelfilm angelegt werden. Unter dem glatt antrockneten Gel entstehen schnell saubere Wundverhältnisse, die eine gute Heilungstendenz aufweisen. Der Gelfilm ist luft- und feuchtigkeitsdurchlässig. Er löst sich leicht in handwarmem Wasser. Die Übersichtlichkeit der Wunde wird nicht gestört, damit bleibt den nachfolgenden Therapeuten die volle Handlungsfreiheit für evtl. notwendig werdende Maßnahmen erhalten. Stark absondernde Wundflächen werden mit sterilen Tupfern gereinigt und erst danach mit Brand- und Wundgel Medice®N behandelt. Bei starken Wundabsonderungen, die über längere Zeit bestehen, sollte man zur Entfernung der Krusten Bäder mit Kaliumpermanganat-Zusatz täglich evtl. mehrmals durchführen. Danach die Wundfläche mit einem sterilen Tupfer abtrocknen und anschließend das Gel wieder auftragen.

Wie lange sollten Sie Brand- und Wundgel Medice®N anwenden?

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach der Entwicklung des Krankheitsbildes.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Brand- und Wundgel Medice®N in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Das Gel kann mit handwarmem Wasser abgewaschen werden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zuwenig Brand- und Wundgel Medice®N angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Sie können die Anwendung nachholen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Bei infizierten Wunden kann es zu einem Rückfall kommen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Brand- und Wundgel-Medice®N auftreten?

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Brand- und Wundgel Medice®N ist im Allgemeinen gut verträglich. In seltenen Fällen kann es durch Polidocanol zu einer Hautreaktion, vermutlich auf allergischer Basis, kommen. Wenn eine entsprechende Veranlagung besteht, erfolgt die Entwicklung einer Überempfindlichkeit im Zeitraum von ca. 1 - 2 Wochen. Harnstoff kann an entzündlichen Hautstellen oder nässenden Wunden Reizerscheinungen hervorrufen.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Absetzen des Präparates. Suchen Sie Ihren Arzt auf.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wann ist Brand- und Wundgel Medice®N auch vor Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendbar?

Wenn die Tube beschädigt ist, kann eine Zersetzung der Bestandteile stattfinden.

Wie ist Brand- und Wundgel Medice®N aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern.

Stand der Information

Mai 2003



03.0400.55

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Liebe Patientin, lieber Patient,
egal, ob Sie der Wirkung von **Brand- und Wundgel Medice®N** schon seit vielen Jahren vertrauen oder ob Sie es gerade neu für sich und Ihre Familie entdeckt haben:
Wir von MEDICE möchten gerne Ihre Meinung erfahren!

Wobei setzen Sie **Brand- und Wundgel Medice®N** in erster Linie ein?

- Verbrennungen Sonnenbrand Schürfwunden Insektenstiche

anderes, was? _____

Wie zufrieden sind Sie mit der Wirkung von **Brand- und Wundgel Medice®N**?

Vielen Dank für Ihre Meinung.

Als kleines Dankeschön für Ihre Mitarbeit können Sie bei uns einen **Erste-Hilfe-Plan** anfordern.

Schreiben Sie an:

MEDICE
Service-Abt. **Brand- und Wundgel Medice®N**
Postfach 2063
D-58634 Iserlohn

Abs. _____
Name _____
Straße _____
PLZ/Ort _____