

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.



Antifungol® Heilpaste

Paste

Zusammensetzung

Arzneilich wirksame Bestandteile:

1 g Paste enthält 0,01 g Clotrimazol und 0,15 g Zinkoxid.

Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol, Cetylstearylalkohol, Hexadecetylpalmitat, dickflüssiges Paraffin, Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen mit 25 g (N1) und 50 g (N2) Paste

Antifungol® Heilpaste ist ein Mittel zur Behandlung von Pilz-
erkrankungen der Haut.

HEXAL AG

Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen
Tel.: (08024) 908-0, Fax: (08024) 908-290
e-mail: patientenservice@hexal.de

Hersteller

Salutas Pharma GmbH,
ein Unternehmen der HEXAL AG
Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Anwendungsgebiete

Pilzinfektionen der Haut, verursacht durch Dermato-
phyten, Hefen, Schimmelpilze und andere wie Malasse-
zia furfur, insbesondere im Bereich von Hautfalten (z. B.
zwischen den Zehen, in der Leistenbeuge).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Antifungol® Heilpaste nicht anwenden?

Sie dürfen Antifungol® Heilpaste nicht anwenden bei
Überempfindlichkeit gegen Clotrimazol, Zinkoxid oder
einen der sonstigen Bestandteile.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit be- achten?

Clotrimazolhaltige Präparate sollten in der Frühschwang-
erschaft nicht großflächig (nicht mehr als 30 % der Kör-
peroberfläche) angewendet werden, da eine epide-
miologische Studie Hinweise auf eine erhöhte Fehlge-
burtsrate nach vaginaler Anwendung von Clotrimazol in
den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft ergeben hat.

Um den direkten Kontakt des Säuglings mit Clotrimazol
zu vermeiden, sollte Antifungol® Heilpaste von Stillenden
nicht im Brustbereich angewendet werden.

Wechselwirkungen

Welche Wechselwirkungen zwischen Antifungol® Heil- paste und anderen Arzneimitteln sind zu beachten?

Clotrimazol vermindert die Wirksamkeit anderer Mittel zur

Behandlung von Pilzkrankungen wie Amphotericin und
andere Polyenantibiotika (Nystatin, Natamycin).

Vor der Anwendung anderer auf der Haut anzuwenden-
der Mittel ist Antifungol® Heilpaste vollständig zu entfernen,
da deren Wirksamkeit eingeschränkt werden kann.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem
angewendete Arzneimittel gelten können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Anti-
fungol® Heilpaste nicht anders verordnet hat. Bitte halten
Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Antifungol®
Heilpaste sonst nicht richtig wirken kann.

Wie viel Paste und wie oft sollten Sie Antifungol® Heil- paste anwenden?

Tragen Sie die Paste 2mal täglich, morgens und abends,
auf die erkrankten Hautstellen auf.

Wie sollten Sie Antifungol® Heilpaste anwenden?

Tragen Sie die Paste dünn auf die erkrankten Hautstellen
auf.

Nach jedem Waschen sollten Sie die Zehenzwischen-
räume und Hautfalten gründlich abtrocknen.

Wie lange sollten Sie Antifungol® Heilpaste anwenden?

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Ausmaß
und Lokalisation der Erkrankung. Sollte nach 2 Wochen
keine Besserung erreicht sein, sollten Sie einen Arzt zu
Rate ziehen.

Bei komplizierten Pilzinfektionen kann eine längere Be-
handlungsdauer erforderlich sein.

Nach Abklingen der akut entzündlichen Symptomatik
und der subjektiven Beschwerden sollte noch einige Zeit
weiterbehandelt werden, um eine vollständige Abhei-
lung der Pilzinfektion zu erzielen.

In der Regel beträgt die Behandlungsdauer 2 Wochen,
kann aber bis zu 4 Wochen ausgedehnt werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Bei nicht ausreichend langer Behandlung kann sich die
Pilzkrankung erneut ausbreiten oder wieder auftreten
(Rückfall).

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Antifungol® Heilpaste auftreten?

Gelegentlich können Hautirritationen mit Rötung, Ste-
chen und Brennen vorkommen.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile können allergische Reaktionen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Packung aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Antifungal® Heilpaste aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch des Behältnisses ist die Paste bis zu 4 Wochen haltbar.

Stand der Information

März 2002

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!

546518

