

Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln

Wirkstoff: Aluminiumchlorid

Traditionelles Arzneimittel bei Entzündungen in der Mundhöhle**Zusammensetzung**

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

10 ml Lösung enthalten: Aluminiumchlorid-Hexahydrat 2,2183 g.

Sonstige Bestandteile:

Indigotin (E 132), gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle.

Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln ist erhältlich in Packungen mit 30 ml Konzentrat (N2), 50 ml Konzentrat (N2) und 100 ml Konzentrat (N3).

Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei leichten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut.

Sollten bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut die Beschwerden länger als 1 Woche andauern, ist ein Arzt aufzusuchen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln nicht anwenden?

Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder den sonstigen Bestandteil.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollte Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es darf deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln darf nur verdünnt angewendet und darf nicht eingenommen werden.

Worauf müssen Sie noch achten?

Sollte Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln versehentlich auf die Kleidung getropft sein, ist diese sofort mit kaltem Wasser gut auszuwaschen.

Bitte beachten Sie, dass verdünntes Mallebrin® und besonders Mallebrin® Konzentrat auch auf Teppich- und anderen Bodenbelägen, Möbel-, Kunststoff- und Metalloberflächen zu nicht mehr entfernbaren Flecken führen kann. Vermeiden Sie den Kontakt von Mallebrin® mit diesen Materialien, und waschen Sie versehentlich verschüttete Lösung sofort ab.

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln und wie beeinflusst Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln die Wirkungen von anderen Arzneimitteln?

Bisher sind keine Arzneimittel bekannt, die die Wirkung von Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln beeinflussen bzw. in

ihrer Wirksamkeit durch dieses Arzneimittel beeinflusst werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln nicht anders verordnet.

Wie viel von Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln und wie oft sollten Sie Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln anwenden?

Geben Sie 15 - 20 Tropfen Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln in ein Glas Wasser (ca. 150 ml). Gurgeln Sie mit dieser Lösung 2 - 3mal täglich.

Wie lange sollten Sie Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln anwenden?

Die Anwendungsdauer ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter „Anwendungsgebiete“.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Mallebrin® Konzentrat zum Gurgeln auftreten?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Stand der Information

Oktober 2002

GUTE BESSERUNG wünscht Ihnen Krewel Meuselbach!