



Bepanthen®



Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



Gebrauchsinformation

Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME

Zusammensetzung

1 g Creme enthält

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Chlorhexidinbis(D-gluconat) 0,005 g

Dexpanthenol 0,05 g

Sonstige Bestandteile:

Macrogolstearat 1500; Glycerolmonostearat 40-55; Cetomacrogol 1000; Dickflüssiges Paraffin; Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.); Dimeticon 1000; Glycerol 85%; Hartparaffin; Hyetellose; Gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Creme

Tube mit 20 g

Antiseptische Wundcreme

Pharmazeutischer Unternehmer:

Bayer Vital GmbH

D-51368 Leverkusen

Hersteller:

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell-Straße 7

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Anwendungsgebiete

Zur antiseptischen Behandlung von oberflächlichen Wunden; Schürf-, Riss-, Platz- und Kratzwunden; Verbrennungen 1. Grades.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME nicht anwenden?

Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile von Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME sind.

Das Präparat darf nicht angewendet werden bei tiefen Wunden, Unterschenkelgeschwür (Ulcus cruris) und unter Verwendung eines dicht abschließenden und abdeckenden Verbandes (Okklusivverband).

Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME sollte nicht am Auge oder in unmittelbarer Augennähe angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Für Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME liegen keine klinischen Daten über exponierte Schwangere vor. Bei der Anwendung in der Schwangerschaft ist deshalb Vorsicht geboten. Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME soll während der Schwangerschaft nicht großflächig angewendet werden.

Für Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME liegen keine klinischen Daten über eine Anwendung während der Stillzeit und zum Übergang in die Muttermilch vor. Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME soll während der Stillzeit nicht großflächig angewendet werden. Stillende sollten Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME nicht im Bereich der Brust anwenden.


Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Während der langjährigen Anwendung haben sich keine klinischen Hinweise auf Risiken bei spezifischen Patientengruppen ergeben.

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.



Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME sonst nicht richtig wirken kann!

Wie oft sollten Sie Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME anwenden?

Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME sollte 2mal täglich angewendet werden.

Wie sollten Sie Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME anwenden?

Die Creme wird auf die Wunde dünn aufgetragen. Wenn es erforderlich ist, kann die Wunde mit einem geeigneten Verband (Pflaster, Mullverband etc.) versehen werden.

Wie lange sollten Sie Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME anwenden?

Die Behandlungszeit beträgt erfahrungsgemäß ca. 1–2 Wochen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME auftreten?

Wie alle Arzneimittel kann Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

sehr häufig	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
gelegentlich	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
sehr selten	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Nach dem Auftragen kann gelegentlich ein vorübergehendes Brennen auftreten.

In Einzelfällen kann es nach dem Auftragen von Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME zu Überempfindlichkeitsreaktionen an der Haut kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Faltschachtel und Tube aufgedruckt.

Nach Anbruch der Tube ist Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME noch 6 Monate haltbar. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern!

Stand der Information

Mai 2005

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Bayer

Zusätzliche Hinweise und Erläuterungen für Patienten

Liebe Patientin, lieber Patient,

zur Behandlung Ihrer Hautverletzung haben Sie Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME erhalten. Wir möchten Ihnen hierzu einige ergänzende Informationen geben.

Wie wirkt Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME?

Die Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME eignet sich zur antiseptischen Wundbehandlung bei oberflächlichen Wunden und zur Anwendung bei leichten Verbrennungen (1. Grades).

- Der Wirkstoff Dexpanthenol kann durch seine enge chemische Verwandtschaft mit der Pantothersäure der Gruppe der B-Vitamine zugerechnet werden. Die Pantothersäure ist im Pflanzen- und Tierreich weit verbreitet und stellt u. a. einen wesentlichen Bestandteil des normalen Stoffwechsels der Haut dar. Dem Dexpanthenol wird eine fördernde Wirkung auf die Erneuerung des Hautgewebes zugeschrieben.
- Der zweite Wirkstoff, Chlorhexidinbis(D-gluconat), der seit Jahren als Antiseptikum verwendet wird, besitzt eine ausgeprägte antibakterielle Wirkung und trägt auf diese Weise zur Vorbeugung von Wundinfektionen bei.

Welche Eigenschaften hat Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME?

Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME ist gut hautverträglich, sie enthält keine Duftstoffe und ist auf einen schwach sauren pH-Wert (5,8 – 6,3) eingestellt. Durch den hohen Wasseranteil wirkt Bepanthen® ANTISEPTISCHE WUNDCREME angenehm kühlend. Die Creme färbt nicht, lässt sich leicht auftragen und zieht schnell ein, ohne zu fetten.