



Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.



Cromohexal® Augentropfen

Wirkstoff: Cromoglicinsäure-Dinatriumsalz

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 ml Lösung enthält 20 mg Cromoglicinsäure-Dinatriumsalz.

Sonstige Bestandteile:

Benzalkoniumchlorid, Natriumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat, Natriumedetat, Natriummonohydrogenphosphat, Sorbitol, Wasser für Injektionszwecke

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 10 ml (N1) Augentropfen

Kombipackung mit 10 ml (N1) Augentropfen und 15 ml (N1) Nasenspray

Cromohexal® Augentropfen ist ein Arzneimittel gegen allergische Bindehautentzündung.

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Telefon: (08024) 908-0

Hersteller:

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co KG

Schützenstraße 99-101

88212 Ravensburg

Anwendungsgebiete

Allergisch bedingte, akute und chronische Bindehautentzündung (Konjunktivitis), z. B. Heuschnupfen-Bindehautentzündung, Frühlingkatarrh ((Kerato-) Konjunktivitis vernalis)

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Cromohexal® Augentropfen nicht anwenden?

Cromohexal® Augentropfen dürfen Sie nicht anwenden, wenn Sie auf

Cromoglicinsäure bzw. auf einen der sonstigen Bestandteile überempfindlich reagieren.

Was muß in Schwangerschaft und Stillzeit beachtet werden?

Beim Menschen gibt es bisher keine Anhaltspunkte für eine fruchtschädigende Wirkung, jedoch reichen die vorhandenen Erfahrungen für eine endgültige Abschätzung des Risikos nicht aus. Der Wirkstoff Cromoglicinsäure wird in geringen Mengen in die Muttermilch ausgeschieden.

Cromohexal® Augentropfen sollten daher im ersten Drittel der Schwangerschaft aus Sicherheitsgründen nicht oder nur unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abschätzung eingesetzt werden. Auch im weiteren Schwangerschaftsverlauf und während der Stillzeit darf eine Anwendung von Cromohexal® Augentropfen nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abschätzung durch den behandelnden Arzt erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Unmittelbar nach Anwendung kommt es zu einer kurzfristigen Beeinträchtigung des Sehvermögens.

Bei Entzündungen am Auge, auch bei allergischer Bindehautentzündung, ist der Augenarzt zu befragen, ob trotz der Beschwerden weiterhin Kontaktlinsen getragen werden dürfen. Wenn der Arzt das Tragen von Kontaktlinsen gestattet, ist folgendes zu beachten:

Nehmen Sie die Kontaktlinsen vor dem

Eintropfen heraus, und setzen Sie diese erst 15 Minuten nach dem Eintropfen wieder ein.

Wechselwirkungen

Keine bekannt

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Cromohexal® Augentropfen nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Cromohexal® Augentropfen sonst nicht richtig wirken können.

Wie oft und wieviele Tropfen Cromohexal® Augentropfen sollten Sie anwenden?

Kinder und Erwachsene tropfen 4mal täglich 1 Tropfen in jedes Auge.

Wie sollten Sie Cromohexal® Augentropfen anwenden?

Tropfen Sie Cromohexal® Augentropfen in den Bindehautsack des Auges. Dazu beugen Sie den Kopf leicht nach hinten, blicken nach oben und ziehen das Unterlid etwas vom Auge ab. Durch Druck auf das Fläschchen tropfen Sie einen Tropfen Cromohexal® Augentropfen in den unteren Bindehautsack. Bringen Sie die Tropföffnung nicht mit dem Auge in Berührung. Nach dem Eintropfen schließen Sie langsam das Auge. Das Fläschchen nach dem Gebrauch sofort verschließen.

Wie lange sollten Sie Cromohexal® Augentropfen anwenden?

Sie sollten auch nach dem Abklingen der Beschwerden die Behandlung mit Cromohexal® Augentropfen so lange fortführen, wie Sie den allergisierenden Substanzen (Hausstaub, Pilzsporen, Pollen usw.) ausgesetzt sind.

Wenn Sie Cromohexal® Augentropfen über einen längeren Zeitraum anwenden wollen, sollten Sie die Notwen-

digkeit der Behandlung vom Arzt feststellen lassen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Cromohexal® Augentropfen auftreten?

Selten kann es zu Augenbrennen, Bindehautschwellung (Chemosis), Fremdkörpergefühl sowie zu einer gesteigerten Durchblutung der Bindehaut (konjunktivale Hyperämie) kommen. Im allgemeinen klingen die Beschwerden spontan ab. Bei stärkeren Beschwerden, insbesondere bei Verdacht auf Überempfindlichkeit gegen Cromohexal® Augentropfen ist ein Arzt aufzusuchen.

Cromohexal® Augentropfen enthalten Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmittel), das zu Nebenwirkungen wie z. B. allergischen Reaktionen führen kann.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Packung aufgedruckt. Das Arzneimittel soll nach diesem Datum nicht mehr angewendet werden!

Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses:

Verwenden Sie Cromohexal® Augentropfen nach Anbruch der Flasche nicht länger als 6 Wochen.

Wie ist Cromohexal® aufzubewahren?

Bewahren Sie Cromohexal® Augentropfen vor Licht geschützt und nicht über 25 °C auf.

Stand der Information

Dezember 1998

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!
Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!

