

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Fungizid-ratiopharm[®] Pumpspray

Wirkstoff: Clotrimazol 10 mg/ml

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 ml Lösung enthält 10 mg Clotrimazol.

Sonstige Bestandteile:

Benzylalkohol, 2-Octyldodecanol, Propan-2-ol, Macrogol, Propylenglycol, Natriumcitrat, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 1 Sprühflasche zu 40 ml Lösung

Stoff- oder Indikationsgruppe

Antimykotikum zur topischen Anwendung (Arzneimittel zur äußerlichen Behandlung von Pilzinfektionen der Haut).

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm
Telefon: (07 31) 4 02 02, Telefax: (07 31) 4 02 73 30
www.ratiopharm.de

Hersteller:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren
Telefon: (0 73 44) 1 40, Telefax: (0 73 44) 14 16 20
www.merckle.de

Anwendungsgebiete

Pilzinfektionen (Mykosen) der Haut durch Dermatophyten, Hefen (z. B. Candida-Arten), Schimmelpilze und andere.

Im Besonderen:

- Mykosen der Haut, der Füße und der Hautfalten
- Pityriasis versicolor (Malassezia furfur)
- oberflächliche Candidosen

Hinweis:

Fungizid-ratiopharm[®] Pumpspray ist für die Anwendung auf den Schleimhäuten und im Genitalbereich nicht geeignet.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Fungizid-ratiopharm[®] Pumpspray nicht anwenden?

Fungizid-ratiopharm[®] Pumpspray darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Clotrimazol oder einen der sonstigen Bestandteile.

Fungizid-ratiopharm[®] Pumpspray darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Propylenglykol oder Polyethylenglykol bzw. Empfindlichkeit gegen Propan-2-ol nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in der Stillzeit beachten?

Um den direkten Kontakt des Säuglings mit Clotrimazol zu vermeiden, darf Fungizid-ratiopharm[®] Pumpspray von Stillenden nicht im Brustbereich angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Propylenglykol oder Polyethylenglykol bzw. Empfindlichkeit gegen Propan-2-ol empfiehlt es sich, anstelle der Lösung eine von den oben genannten Substanzen freie Darreichungsform (z. B. Fungizid-ratiopharm[®] Creme) zu verwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Fungizid-ratiopharm[®] Pumpspray, und was müssen Sie beachten, wenn Sie zusätzlich andere Arzneimittel anwenden?

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können!

Fungizid-ratiopharm® Pumpspray kann die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyantibiotika (wie Nystatin und Natamycin) vermindern.

Bei bestimmungsgemäßer topischer (äußerlicher) Anwendung von Clotrimazol sind keine weiteren Wechselwirkungen bekannt und aufgrund der geringen Resorption von Clotrimazol auch nicht zu erwarten.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Fungizid-ratiopharm® Pumpspray nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Fungizid-ratiopharm® Pumpspray sonst nicht richtig wirken kann.


Wie und wie oft sollten Sie Fungizid-ratiopharm® Pumpspray anwenden?

Das Spray 2-mal täglich auf die erkrankten Hautpartien aufsprühen.


Hinweis:

Fungizid-ratiopharm® Pumpspray enthält Propan-2-ol und Propylenglykol, die bei der Berührung mit farbigen Gegenständen (z. B. Teppichboden oder Kleidungsstücken) zu Aufhellungen führen können.


Handhabungshinweis



Ziehen Sie vor Gebrauch die transparente Schutzkappe ab.



oder



Die Flasche kann je nach Anwendungsort mit dem Sprühkopf senkrecht nach unten „Überkopflage“ oder aber auch „normal“, mit dem Sprühkopf nach oben gehalten werden.

Betätigen Sie den Sprühkopf bei erstmaligem Gebrauch mehrmals, bis ein feiner Sprühnebel entsteht. Sprühen Sie die Lösung auf die erkrankten Hautpartien auf.

Wie lange sollten Sie Fungizid-ratiopharm® Pumpspray anwenden?

Über die Dauer der Behandlung entscheidet der behandelnde Arzt.

Die Dauer der Therapie richtet sich nach Art, Ausmaß und Lokalisation der Erkrankung. Im Allgemeinen sollte sie nicht unter 4 Wochen betragen.

Pityriasis versicolor heilt im Allgemeinen in 1 – 3 Wochen ab.

Um eine vollständige Ausheilung zu erreichen, sollte die Behandlung nicht sogleich nach dem Abklingen der akuten entzündlichen Krankheitserscheinungen oder der subjektiven Beschwerden beendet werden. Bei Fußpilz sollte zur Vermeidung von erneutem Wiederauftreten der Beschwerden (Rezidive), trotz rascher subjektiver Besserung, die Therapie ca. 2 Wochen über das Verschwinden der Symptome hinaus fortgesetzt werden. Nach jedem Waschen sollten die Zehenzwischenräume gründlich abgetrocknet werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Fungizid-ratiopharm® Pumpspray auftreten, und welche Gegenmaßnahmen sind gegebenenfalls zu ergreifen?

Gelegentlich kann es zu Hautirritationen mit Rötung, Stechen und Brennen kommen.

Bei Überempfindlichkeit gegen Propylenglykol oder Polyethylenglykol können allergische Hautreaktionen auftreten (siehe Hinweis „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“).

Durch den Alkoholgehalt kann es zur Austrocknung der Haut kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Flasche aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Achten Sie stets darauf, Fungizid-ratiopharm® Pumpspray so aufzubewahren, dass dieses Arzneimittel für Kinder nicht zu erreichen ist!

Stand der Information

Januar 2002

Versionscode: Z02