

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil Sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Ginkgo D2 Syxyl Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D2 100 mg

HAB 2000, Vorschrift 7

Sonstige Bestandteile:

Magnesiumstearat, Kartoffelstärke, Lactose

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung mit 60 Tabletten zum Einnehmen N1

Originalpackung mit 120 Tabletten zum Einnehmen N1

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer:

Syxyl, Gereonsmühlengasse 5, 50670 Köln

Telefon: 0221/1652630, Telefax 0221/1652631

E-Mail: info@syxyl.de

Hersteller und Mitvertreiber:

Artesan Pharma, Wendlandstraße 1, 29439 Lüchow

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis:

Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome fort dauern, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Ginkgo D2 Syxyl nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegen Ginkgo-biloba-Zubereitungen.

Wann dürfen Sie Ginkgo D2 Syxyl erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Bei fort dauernden Krankheitssymptomen während der Therapie.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Siehe auch unter „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch gelten können, wenn die Einnahme wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung.

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, 1 Tablette einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette einnehmen.

Allgemeiner Hinweis:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung und Anwendungsfehler:

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:

Sehr selten leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen. In Einzelfällen können allergische Hautreaktionen auftreten.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweis:

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Umkarton und auf dem Blister aufgedruckt. Verwenden Sie die Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: 17.06.2003

Pflichttext:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweis: Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome fortauern, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.