

frubienzym[®]

zuckerfrei

Halsschmerztabletten

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder Apothekerin/Apotheker.

Gebrauchsinformation

frubienzym[®] Halsschmerztabletten

Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Lysozym (Enzym aus Hühnereiklar) 5,0 mg, entspricht 130.000 E.(FIP)
Cetylpyridiniumchlorid 3,0 mg

Sonstige Bestandteile:

Magnesiumstearat, natürliches Pfefferminzaroma, Sorbitol

Hinweis für Diabetiker:

frubienzym Halsschmerztabletten sind **Diabetiker-geeignet**:
1 Tablette enthält als Zuckeraustauschstoff Sorbitol. 1 Tablette entspricht 0,12 BE.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen Tabletten in den Größen 20 (N1) und 50 (N2)

Stoff- bzw. Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

frubienzym Halsschmerztabletten dienen zur lokalen Keimzahl-

401585/DE/6

verminderung (Desinfektion) und damit zur Linderung der Beschwerden im Mund-, Hals- und Rachenraum.

Das in **frubienzym Halsschmerztabletten** enthaltene Lysozym ist ein natürliches Abwehrenzym. Es löst Schleimsubstanzen auf, mit denen sich Krankheitskeime schützend umhüllen.

Cetylpyridiniumchlorid ist eine desinfizierende Substanz, die verschiedene Bakterien und Viren abtötet.

Pharmazeutischer Unternehmer

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173, 55216 Ingelheim
Telefon: (0 18 05) 77-90 90
Telefax: (0 61 32) 72-99 99

Pharmazeutischer Hersteller

Boehringer Ingelheim France
12, Rue André Huet
51060 Reims Cedex
Frankreich

Anwendungsgebiete

Zur symptomatischen Behandlung infektiöser und entzündlicher Erkrankungen im Mund-Hals-Rachenraum, die mit Rötung, Schwellung und Halsschmerzen einhergehen, z. B. Rachenentzündung.

Hinweis:

Bei schweren Erkrankungen, die mit hohem Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen einhergehen, sollen **frubienzym Halsschmerztabletten** nicht länger als 2 Tage ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie **frubienzym Halsschmerztabletten** nicht anwenden?*

frubienzym Halsschmerztabletten dürfen bei Überempfindlichkeit gegen Hühnereiweiß und Cetylpyridiniumchlorid oder einen der sonstigen Bestandteile sowie bei offenen Wunden im Mund nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wegen des Fehlens entsprechender Untersuchungsergebnisse soll in der

Schwangerschaft und Stillzeit auf die Anwendung von **frubienzym Halsschmerztabletten** verzichtet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

*Worauf müssen Sie bei der Anwendung von **frubienzym Halsschmerztabletten** achten?*

Personen mit Neigung zu allergischem Kontaktekzem sollten die Anwendung von Zubereitungen vermeiden, die quaternäre Ammoniumverbindungen (z. B. Cetylpyridiniumchlorid) enthalten.

Bei diesen Patienten ist die Möglichkeit einer allergischen Reaktion erhöht.

Wechselwirkungen

Die Wirkung von **frubienzym Halsschmerztabletten** kann durch die gleichzeitige Aufnahme von organischen Substanzen (z. B. Milch) und lipidhaltigen Substanzen (Lezithin) vermindert werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **frubienzym Halsschmerztabletten** nicht anders verordnet hat.

*Wie viel und wie oft sollten Sie **frubienzym Halsschmerztabletten** anwenden?*

4 – 6 Tabletten über den Tag verteilt im Mund zergehen lassen.

*Wie sollten Sie **frubienzym Halsschmerztabletten** anwenden?*

Langsam im Mund – am besten in der Backentasche – zergehen lassen.

*Wie lange sollten Sie **frubienzym Halsschmerztabletten** anwenden?*

frubienzym Halsschmerztabletten eignen sich für die gezielte Behandlung akuter Beschwerden, nicht jedoch für die Langzeitbehandlung.

Nebenwirkungen

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **frubienzym Halsschmerztabletten** auftreten?*

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen wie z. B. Schwellungen der Haut oder der Schleimhäute, Nesselsucht, Magenbeschwerden, Schwindel, Blutdruckabfall mit Atemnot berichtet worden.



Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Wenn Nebenwirkungen auftreten, sind **frubienzym Halsschmerztabletten** abzusetzen; je nach Schwere der Symptome ist ein Arzt aufzusuchen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

*Wie sind **frubienzym Halsschmerztabletten** aufzubewahren?*

Gut verschlossen, vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Stand der Information

März 2003

Arzneimittel bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für die Gesundheit und baldige Linderung der Beschwerden.