


[Home](#) [Kontakt](#) [International](#)
FachbereichUsername Passwort DocCheck **Suche**
[Unternehmen](#) [Marken & Produkte](#) [Job & Karriere](#) [Presse & Bilder](#) [Service](#)
[Markenübersicht](#)[Produktfinder](#)[zurück](#)[Drucken](#)[Empfehle](#)[Infoletter](#)**Carnigen® Tropfen****Gebrauchsinformation**

Liebe Patientin, lieber Patient! Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Carnigen® Tropfen

Wirkstoff: Oxilofrinhydrochlorid

Zusammensetzung:

1ml Lösung enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Oxilofrinhydrochlorid 20 mg
 Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Ethanol 96 %, Glycerol 85 %,
 als Konservierungsmittel Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-
 hydroxybenzoat (Parabene) gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt:

Lösung zum Einnehmen, erhältlich in Packungen mit 20 ml, 50 ml und 100 ml.

Stoffgruppe oder Wirkungsweise:

Arzneimittel zur Stabilisierung von Kreislauf und erniedrigtem Blutdruck.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Cassella-med
 Gereonsmühlengasse 1
 D-50670 Köln
 Telefon: 0221 / 120157
 Telefax: 0221 / 1652-513
 E-Mail: cmed@cassella-med.de

Hersteller:

A. Nattermann & Cie. GmbH
 Nattermannallee 1
 D-50829 Köln
 Telefon: 0221 / 509-01
 Telefax: 0221 / 509-2711

Anwendungsgebiete:

Wozu werden Carnigen Tropfen angewendet?

Zur Behandlung von krankhaft erniedrigtem Blutdruck (Hypotonie) oder von Blutdruckabfall in aufrechter Körperhaltung, insbesondere beim Aufstehen (orthostatische Kreislaufregulationsstörungen), und der hierdurch verursachten Beschwerden wie z. B. Schwindel, Schwarzwerden vor den Augen, Neigung zu Ohnmachten, morgendliche Antriebsschwäche, rasche Ermüdbarkeit, Wetterfühligkeit (z. B. bei Föhn), Kopfschmerzen und Neigung zu Herzklopfen. Kreislaufschwäche oder -labilität auch bei Jugendlichen, während der Schwangerschaft, in den Wechseljahren sowie nach Operationen, Infektionen oder längerer Bettlägerigkeit.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Carnigen Tropfen nicht einnehmen?

Ca

[Kontakt](#)[Kontakt](#)Sie haben
Marke od

Carnigen Tropfen dürfen Sie nicht einnehmen bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Oxilofrinhydrochlorid, gegen die Konservierungsmittel Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels
- schweren organischen Herzerkrankungen
- gestörter Herzschlagfolge (Herzrhythmusstörungen)
- ausgeprägter Überfunktion der Schilddrüse (Thyreotoxikose)
- Geschwulst des Nebennierenmarks, die zeitweilig oder ständig Bluthochdruck verursacht (Phäochromozytom)
- Erhöhung des Augeninnendrucks (Grüner Star, speziell Engwinkelglaukom).

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Während der Schwangerschaft sollen Medikamente grundsätzlich nur bei strenger Indikationsstellung eingenommen werden. Die Einnahme von Carnigen Tropfen ist während Schwangerschaft und Stillzeit möglich, wenn der Arzt dies für erforderlich hält.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Carnigen Tropfen sind auch zur Behandlung von Säuglingen und Kindern geeignet.

Wechselwirkungen:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

Warnhinweise

Enthält 6,9 Vol.-% Alkohol.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Carnigen Tropfen einnehmen?

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihr Arzt Carnigen Tropfen nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, damit Carnigen Tropfen richtig wirken können. Die Dosierung ist dem individuellen Bedarf anzupassen. Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene täglich 3 – 6mal 20 Tropfen ein. Kinder im Alter von 6 – 14 Jahren erhalten täglich 3mal 10 – 20 Tropfen. Säuglinge und Kleinkinder erhalten täglich 3mal 4 – 12 Tropfen.

Wie und wann sollten Sie Carnigen Tropfen einnehmen?

Öffnen Sie die Tropfflasche und halten Sie diese mit der Öffnung senkrecht nach unten. Wenn Sie mit dem Finger auf den Flaschenboden klopfen, treten die Tropfen in gleichmäßigen Abständen heraus und können leicht in einen Teelöffel gezählt werden. Sie können Carnigen Tropfen auch mit etwas Flüssigkeit oder auf Zucker (dies gilt nicht für Diabetiker) einnehmen. Beim Auftreten von Magenbeschwerden (siehe "Nebenwirkungen") empfiehlt sich die Einnahme von Carnigen Tropfen nach den Mahlzeiten. In vielen Fällen ist es zweckmäßig, die erste Tagesdosis sogleich nach dem Aufstehen einzunehmen, da Kreislaufbeschwerden in der Regel in den Morgenstunden besonders ausgeprägt sind. Bei starken morgendlichen Beschwerden kann die erste Einnahme auch einige Zeit, etwa 15 – 30 Minuten, vor dem Aufstehen erfolgen. Die restliche Tagesdosis wird über den Tag verteilt. Beim Auftreten von Unruhe und Schlaflosigkeit (siehe "Nebenwirkungen") sollte die letzte Tagesdosis am frühen Nachmittag eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Carnigen Tropfen einnehmen?

Über die Dauer der Einnahme entscheidet der Arzt.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler:

Was ist zu tun, wenn Sie zu viel Carnigen Tropfen eingenommen haben?

Wenn Sie einmal zu viel Carnigen Tropfen eingenommen haben, genügt es in der Regel, Ihren Arzt um Rat zu fragen, wenn Sie Nebenwirkungen an sich beobachten. Diese können sich äußern in Unruhe, Blutdruckanstieg, Herzjagen, Schock (Kreislaufzentralisation),

eventuell auch beschleunigter Atmung.

Was sollten Sie tun, wenn Sie zu wenig Carnigen Tropfen eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben? Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern führen Sie die Einnahme wie in der Dosierungsanleitung beschrieben fort.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden? Bei Unterbrechen oder vorzeitigem Absetzen der Behandlung ist mit dem Wiederauftreten der Beschwerden zu rechnen.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können auftreten? In seltenen Fällen kann unter höherer Dosierung Herzklopfen auftreten. In Einzelfällen können Magenbeschwerden auftreten. Es kann zu Unruhe und Schlaflosigkeit kommen.

Was ist beim Auftreten von Nebenwirkungen zu tun? Wenn Magenbeschwerden auftreten, empfiehlt sich die Einnahme von Carnigen Tropfen nach den Mahlzeiten. Bei Unruhe und Schlaflosigkeit sollte die letzte Tagesdosis am frühen Nachmittag eingenommen werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine der aufgeführten Nebenwirkungen oder andere unerwünschte Wirkungen unter der Behandlung mit Carnigen Tropfen bemerken.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieses Arzneimittels ist auf der Verpackung aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie sind Carnigen Tropfen zu lagern und aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern / aufbewahren.

Stand der Information:

März 2004

Bitte achten Sie stets darauf, Carnigen Tropfen so aufzubewahren, dass sie für Kinder nicht erreichbar sind.

Erläuterungen und Hinweise für Patienten:

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, zur Behandlung Ihrer Kreislaufstörungen haben Sie sich für Carnigen Tropfen entschieden.

Was sind Kreislaufstörungen?

Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit hängen sehr davon ab, dass alle Teile des Körpers gut mit Blut versorgt werden. Dazu muss der Blutkreislauf sehr anpassungsfähig sein und rasch auf die sehr verschiedenen Anforderungen des täglichen Lebens reagieren. Beispielsweise wird bei körperlicher Arbeit besonders viel Blut in die Arme und Beine geleitet, um den erhöhten Nährstoff- und Sauerstoffbedarf der Muskeln zu decken. Lässt die körperliche Belastung nach, wird auch weniger Blut benötigt. Dagegen muss der Kopf stets gleichmäßig mit Blut versorgt werden, ganz gleich, ob man liegt, sitzt, steht oder sich bewegt. Normalerweise kann der Körper die Blutverteilung sehr gut regulieren, aber bei vielen Menschen ist diese Fähigkeit des Kreislaufs vorübergehend gestört. Man spricht dann von Kreislaufstörungen oder Kreislaufregulationsstörungen.

Zu niedriger Blutdruck:

Damit das Blut durch das stark verzweigte System von Blutgefäßen in jeden Winkel des Körpers strömen kann, muss das Herz durch seine Pumpleistung für einen ausreichenden Druck sorgen. Es gibt Menschen, bei denen der Blutdruck zu niedrig ist. Viele von ihnen fühlen sich wohl oder können als Sportler sogar Höchstleistungen erzielen. Von Hypotonie oder hypotonen Kreislaufstörungen als Krankheit spricht man erst dann, wenn der niedrige Blutdruck zu Beschwerden führt.

Schlechte Blutverteilung:

Viele Patienten mit Kreislaufstörungen haben im Sitzen einen ganz normalen Blutdruck. Aber beim Aufstehen, bei längerem Stehen oder körperlicher Belastung wird das Blut nicht mehr richtig verteilt. Bei aufrechter Körperhaltung versackt dann durch die Schwerkraft zu viel Blut in der unteren Körperhälfte. Dieses Blut fehlt dann im Kopfbereich, so dass es zur vorübergehenden Mangelversorgung des Gehirns kommt. So etwas passiert häufig unmittelbar nach dem Aufstehen oder nach dem Aufrichten aus gebückter Haltung.

Worauf beruht die Wirkung von Carnigen Tropfen?

Der Wirkstoff von Carnigen Tropfen wirkt auf Venen, Herz und Arterien in ausgeglichener Weise. Die kleinen und großen Venen werden enger gestellt. Folglich kann nicht mehr so viel Blut in der unteren Körperhälfte versacken, sondern wird zum Herzen zurückbefördert. Dadurch steht dem Herzen für seine Pumparbeit wieder die normale Blutmenge zur Verfügung. Gleichzeitig werden durch den Wirkstoff Schlagkraft und Leistungsfähigkeit des Herzens gesteigert. Außerdem wird der Widerstand der Arterien, durch die das Herz sein Blut in den Kreislauf pumpt, reguliert. Dadurch wird eine ausreichende Blutversorgung der Organe gewährleistet. Der Wirkstoff von Carnigen Tropfen wirkt wie ein körpereigener Wirkstoff und unterstützt den Körper in seinem Bemühen, den Kreislauf den Belastungen anzupassen. Durch Stabilisierung des Blutdrucks und bessere Blutverteilung im Körper bessern sich auch die Beschwerden.

Pflichttext:

Zur Behandlung von krankhaft erniedrigtem Blutdruck (Hypotonie) oder von Blutdruckabfall in aufrechter Körperhaltung, insbesondere beim Aufstehen (orthostatische Kreislaufregulationsstörungen), und der hierdurch verursachten Beschwerden wie z. B. Schwindel, Schwarzwerden vor den Augen, Neigung zu Ohnmachten, morgendliche Antriebsschwäche, rasche Ermüdbarkeit, Wetterfühligkeit (z. B. bei Föhn), Kopfschmerzen und Neigung zu Herzklopfen. Kreislaufschwäche oder -labilität auch bei Jugendlichen, während der Schwangerschaft, in den Wechseljahren sowie nach Operationen, Infektionen oder längerer Bettlägerigkeit. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Klosterfrau • Klosterfrau Homöopathie • Klosterfrau Mobilind •
 Klosterfrau Broncholind® • Klosterfrau Nervenruh •
 Klosterfrau Gastrolind® • Gastrobin® • taxofit® • Tiger Balm® • neo-
 angin® • Maaloxan® / Maalox® • Soledum® • nasic® • nasic®-cur •
 Bronchicum® • anginetten® • Ricola® • Krügerol® • Vita-Gerin-
 Geistlich® N • regazell energen plus • Contramutan® • Limptar® •
 Cholagogum Nattermann® • Ameu • Bedan • Hepar SL • Jarsin • Kwai •
 Kwai Vitabetics • Kaveri • Faros • Sedonium • Euminz • Enelbin® •
 Carnigen® • Essaven® • Lipostabil® • Melrosum® • Monapax® •
 Traumanase® • Maria Galland • yul® • Goldsam • condomini® •
 Assugrin • Thüringer • Migränin • Mono Migränin • Balneum Aqueo •
 Balneum Hermal • Balneum Intensiv • Balneum Junior •
 Balneum Lutsine • Dobendan • Nurofen • Clearasil •

[top](#)