



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Aciclovir AL Creme

Wirkstoff: Aciclovir 50 mg / 1 g Creme

Zusammensetzung

1 g Creme enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 50 mg Aciclovir

Sonstige Bestandteile: Cetylalkohol, Dimeticon, dickflüssiges Paraffin, Poly(oxyethylen)-5-glyceroltri(palmitat / stearat), Propylenglycol, weißes Vaseline, gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 2 g Creme (N1)

Stoff- oder Indikationsgruppe

Der Wirkstoff von Aciclovir AL Creme hemmt die Vermehrung von Herpes-Viren (Virustatikum).

ALIUD® PHARMA GmbH & Co. KG

Gottlieb-Daimler-Straße 19 · D-89150 Laichingen

Internet: www.aliud.de · E-Mail: info@aliud.de

Anwendungsgebiete

Zur lindernden Behandlung von Schmerzen und Juckreiz bei rezidivierendem Herpes labialis (häufig wiederkehrende durch Herpes simplex-Viren verursachte Lippenbläschen).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Aciclovir AL Creme nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegenüber aciclovirhaltigen Arzneimitteln bzw. einem der sonstigen Bestandteile, insbesondere Cetylalkohol oder Propylenglykol, darf Aciclovir AL Creme nicht angewendet werden. Siehe auch „Worauf müssen Sie noch achten?“.

Aciclovir AL Creme darf nicht auf Schleimhäute (z.B. in der Mundhöhle oder am Auge) aufgetragen werden, da sonst mit lokalen Reizerscheinungen zu rechnen ist.

Wann dürfen Sie Aciclovir AL Creme erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Aciclovir AL Creme nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Falls bei Ihnen eine schwere Störung der körpereigenen Immunabwehr vorliegt, sollten Sie Ihren Arzt vor Behandlungsbeginn befragen.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Obwohl bei Tierversuchen keine teratogene (missbildende) Wirkung beobachtet wurde, sollte die Creme während der Schwangerschaft nur unter sorgfältiger Abwägung des Nutzens und möglicher Risiken angewendet werden.

Die Anwendung der Creme während der Stillzeit im Brustbereich ist zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?

Direkte Einflüsse von Aciclovir AL Creme auf das Reaktionsvermögen und die Verkehrstüchtigkeit sind nicht bekannt.

Worauf müssen Sie noch achten?

Um einen größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollte die Creme bereits bei den ersten Anzeichen der Herpeserkrankung (Brennen, Jucken, Spannungsgefühl und Rötung) angewendet werden. Wenn die Bläschen bereits verkrustet sind, ist eine Behandlung mit Aciclovir AL Creme nicht mehr sinnvoll.



Aciclovir AL Creme enthält die Bestandteile Cetylalkohol und Propylenglycol. Cetylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Aciclovir AL Creme?

Für Aciclovir AL Creme sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?

Ungünstige Einflüsse von Genussmitteln, Speisen und Getränken sind nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Aciclovir AL Creme nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Aciclovir AL Creme sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel und wie oft sollten Sie Aciclovir AL Creme anwenden?

Die Creme wird 5-mal täglich alle 4 Stunden tagsüber auf die infizierten Hautbereiche dünn aufgetragen.

Wie lange sollten Sie Aciclovir AL Creme anwenden?

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 5 Tage. Kommt es während der Behandlung zu einer Verschlechterung der Hauterscheinungen oder sind spätestens nach 10 Tagen Behandlungsdauer die Bläschen nicht verkrustet oder abgeheilt, so ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt. Halten Sie bitte diese Zeiten auch dann ein, wenn Sie sich bereits besser fühlen.

Wie und wann sollten Sie Aciclovir AL Creme anwenden?

Aciclovir AL Creme sollte mittels eines Wattestäbchens aufgetragen werden, indem dieses mit einer für die Größe der infizierten Hautbereiche notwendigen Menge bestrichen wird.

Beim Auftragen sollte darauf geachtet werden, dass nicht nur die bereits sichtbaren Anzeichen des Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung) mit der Creme bedeckt werden, sondern dass auch angrenzende Bereiche in die Behandlung mit einbezogen werden.

Falls das Auftragen mit der Hand erfolgt, sollte diese vorher und nachher gründlich gewaschen werden, um eine zusätzliche Infektion der geschädigten Hautpartien z. B. durch Bakterien bzw. eine Übertragung der Viren auf noch nicht infizierte Schleimhaut und Hautbereiche zu verhindern.

Anwendungsfehler

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Aciclovir AL Creme angewendet haben oder eine Anwendung vergessen haben?

Wenn Sie einmal eine Anwendung vergessen haben so führen Sie diese anschließend dennoch wie verordnet weiter (tragen Sie die Creme z. B. nicht häufiger oder dicker auf).

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden wollen?

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, Aciclovir AL Creme ausreichend lange anzuwenden. Bleibt die Behandlung jedoch erfolglos oder treten bestimmte Nebenwirkungen auf, so fragen Sie bitte einen Arzt um Rat (siehe auch „Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung“ sowie „Nebenwirkungen“).

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Aciclovir AL Creme auftreten?

Nach der Anwendung von Aciclovir AL Creme können vorübergehendes Brennen oder Stechen auf den behandelten Hautabschnitten auftreten. Rötung, Eintrocknung, Juckreiz und Abschuppung der mit Aciclovir AL Creme behandelten Haut wurden gelegentlich beobachtet.

Selten wurden nach Anwendung der Aciclovir AL Creme vom Auftreten einer Kontaktdermatitis berichtet, wurden allergologische Untersuchungen durchgeführt, erwiesen sich in den meisten Fällen die Hilfsstoffe der Cremegrundlage und nicht der Wirkstoff Aciclovir als deren Ursache.

Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen, dass die oben genannten Nebenwirkungen verstärkt auftreten und über die mit der Creme behandelten Hautabschnitte hinausgehen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bitte informieren Sie Ihren Arzt über aufgetretene Nebenwirkungen, damit er diese ggf. spezifisch behandeln kann.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Aciclovir AL Creme aufzubewahren?

Nicht über 25°C aufbewahren!

Stand der Information

Juni 2003

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

0603-01

9210827
0312

