

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Einnahme dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten

Filmtabletten

Wirkstoff: Cyanocobalamin

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 Filmtablette enthält 10 µg Cyanocobalamin.

Hinweis:

Cyanocobalamin gehört zur Gruppe der Stoffe, die zusammenfassend als »Vitamin B₁₂« bezeichnet werden.

Sonstige Bestandteile:

Lactose, Maisstärke, Cellulosepulver, Macrogol, Copolyvidon, Talcum, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Hypromellose, Glycerol, Farbstoff E 171.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 100 Filmtabletten

Stoff- oder Indikationsgruppe

Vitamine

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm
Telefon: (07 31) 4 02 02, Telefax: (07 31) 4 02 73 30

Hersteller:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren
Telefon: (0 73 44) 1 40, Telefax: (0 73 44) 14 16 20

Anwendungsgebiete

Verhütung eines Vitamin-B₁₂-Mangels bei jahrelanger Mangel- und Fehlernährung (z. B. durch streng vegetarische Kost).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten nicht eingenommen werden?

Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten dürfen nicht eingenommen werden bei Unverträglichkeit eines Bestandteils.

Was muss in Schwangerschaft und Stillzeit beachtet werden?

Die empfohlene tägliche Vitamin-B₁₂-Zufuhr in Schwangerschaft und Stillzeit beträgt 4 µg. Nach den bisherigen Erfahrungen haben höhere Einnahmemengen keine nachteiligen Auswirkungen auf das ungeborene Kind.

Vitamin B₁₂ wird in die Muttermilch ausgeschieden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten?

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Einnahmeverschriften, da Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten sonst nicht richtig wirken können!

Wie viel von Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten und wie oft sollten Sie Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten einnehmen?

Es wird täglich 1 Filmtablette Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten eingenommen (entsprechend 10 µg Cyanocobalamin).

Wie und wann sollten Sie Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten einnehmen?

Die Einnahme erfolgt mit ausreichend Flüssigkeit.

Wie lange sollten Sie Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten einnehmen?

Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten sind zur längeren Einnahme bestimmt. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten in zu großen Mengen eingenommen wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Vergiftungen oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten auftreten?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und den Durchdrückpackungen aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie sind Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern und vor Feuchtigkeit schützen!

Stand der Information

Mai 2000

Achten Sie stets darauf, Vitamin B₁₂-ratiopharm® 10 µg Tabletten so aufzubewahren, dass dieses Arzneimittel für Kinder nicht zu erreichen ist!
