

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten

Wirkstoff: Purpursonnenhutkraut Preßsaft, getrocknet 100 mg

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 Tablette ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten enthält 100 mg getrockneter Preßsaft aus frischem blühenden Purpursonnenhutkraut (22 – 65:1).

Sonstige Bestandteile:

Siliciumdioxid, Sorbitol, Natriumcyclamat, Magnesiumstearat.
1 Tablette enthält 570 mg Sorbitol (entsprechend 0,05 BE).

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 20 Tabletten (N1)
Originalpackung mit 50 Tabletten (N2)

Stoff- oder Indikationsgruppe

Pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm
Telefon: (07 31) 4 02 02, Telefax: (07 31) 4 02 73 30

Hersteller:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren
Telefon: (0 73 44) 1 40, Telefax: (0 73 44) 14 16 20

Anwendungsgebiete

Unterstützende Behandlung häufig wiederkehrender (rezidivierender) Infekte im Bereich der Atemwege und der ableitenden Harnwege.

Hinweis:

Infekte im Bereich der Atemwege erfordern bei häufiger Wiederkehr, länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf die Rücksprache mit dem Arzt.

Wiederholt auftretende Beschwerden im Bereich der Harnwege erfordern grundsätzlich eine ärztliche Abklärung und regelmäßige ärztliche Kontrollen. Unabhängig davon ist bei Blut im Urin, bei Fieber oder beim Anhalten der Beschwerden über 5 Tage die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten nicht anwenden?

ECHINACEA-ratiopharm 100 Tabletten sind bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler nicht anzuwenden.

Aus grundsätzlichen Überlegungen dürfen ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten nicht angewendet werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen (Leukosen), rheumatischen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen und anderen Autoimmunerkrankungen.

Wann dürfen Sie ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht einnehmen dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Das Arzneimittel enthält Sorbitol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Anwendung bis zu 0,57g Sorbitol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht bei jugendlichen und erwachsenen Patienten mit angeborener Fructose-Unverträglichkeit. Für diese Patienten ist die Anwendung des Arzneimittels nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zulässig.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen soll das Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Wegen nicht ausreichend vorliegenden Untersuchungen mit diesem Arzneimittel bei Kindern soll dieses Arzneimittel bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Keine

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten sonst nicht richtig wirken können.

Wieviel und wie oft sollten Sie ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Kinder ab dem 12. Lebensjahr und Erwachsene 3 – 4 mal täglich 1 Tablette.

Wie und wann sollten Sie ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten einnehmen?

Die Tabletten können gelutscht, zerkaugt oder mit Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) eingenommen werden. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten.

Wie lange sollten Sie ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten einnehmen?

Nicht länger als 8 Wochen.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu beachten, wenn ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten in zu großen Mengen angewendet wurden?

Von den pflanzlichen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten auftreten?

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und den Durchdrückpackungen aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information

November 1998

Achten Sie stets darauf, **ECHINACEA-ratiopharm® 100 Tabletten** so aufzubewahren, daß dieses Arzneimittel für Kinder nicht zu erreichen ist!
